CENTRO SERVIZI GAL

BOLLETTINO AGROMETEOROLOGICO N° 35 del 30/10/2020

Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA

SAPORI valle camonica

PER RIMANERE AGGIORNATI SULLE OPERAZIONI DA ESEGUIRE IN CAMPO E' POSSIBILE ASCOLTARE LA SEGRETERIA TELEFONICA AL NUMERO 0364/324077: OPZIONE 1 MELO – OPZIONE 2 VITE – OPZIONE 4 PICCOLI FRUTTI/ULIVO

Per informazioni:
www.saporidivallecamonica.it
uff.agricoltura@cmvallecamonica.bs.it
info@galvallecamonicavaldiscalve.it
Comunità Montana di Vallecamonica – Servizio Agricoltura 0364 324019

CON LA COLLABORAZIONE DI:

A. P. A. V.
Associazione per i Produttori Agricoli di Vallecamonica

➔ PREVISIONI METEOROLOGICHE

(previsioni della rete meteorologica regionale: https://www.arpalombardia.it/Pages/Meteorologia/Previsioni-e-Bollettini.aspx#/topPagina)







VENERDI' 30 OTTOBRE **SABATO 31 OTTOBRE** **DOMENICA 1 NOVEMBRE**

Le condizioni meteo appaiono caratterizzate da tempo stabile.

➔ PRECIPITAZIONI IN VALLE CAMONICA

PRECIPITAZIONI TOTALI – ANNO 2017-2019:

COMUNE	2017	2018	2019
EDOLO	1410,4 mm	1123,9 mm	1274,2 mm
CAPO DI PONTE	1330,5 mm	1223,6 mm	1217,4 mm
DARFO BOARIO TERME	1127,1 mm	1398,2 mm	1440,2 mm

PRECIPITAZIONI 2020

COMUNE	MM/SETTIMANA	MM/MESE	MM/ANNO	MM/MESE OTTOBRE 2019
EDOLO	96,0	228,4	964,6	143,6
CAPO DI PONTE	113,8	200,2	1038,2	129,4
DARFO BOARIO TERME	99,6	217,4	995,6	138,2



DIVISIONE DELLE MACROZONE:

ZONA 1: PIANCAMUNO - ARTOGNE – GIANICO – DARFO B.T. – ANGOLO TERME - PIANCOGNO – OSSIMO;
ZONA 2: ESINE – BERZO INFERIORE – BIENNO – CIVIDATE CAMUNO –BRENO (SINISTRA OROGRAFICA FIUME OGLIO) - NIARDO;
ZONA 3: MALEGNO – BRENO (DESTRA OROGRAFICA FIUME OGLIO) – LOSINE;
ZONA 4: CERVENO – BRAONE - CETO – ONO SAN PIETRO – CAPO DI PONTE – SELLERO – BERZO DEMO;

➔ PRATICHE COLTURALI

LEGNO NERO

Lo *Hyalesthes obsoletus* (vettore del legno nero) sverna sulle radici di ortica, convolvolo e artemisia. Rimuovendo tali essenze si **riduce notevolmente** la presenza dell'insetto. **In questo periodo rimuovere manualmente o meccanicamente le essenze citate.**

PIANTE SINTOMATICHE FLAVESCENZA DORATA E LEGNO NERO.

In questo periodo è obbligatorio estirpare le piante sintomatiche di Flavescenza dorata e Legno nero, se si vuole arrestare la diffusione di questi pericolosi fitoplasmi.

NUOVI IMPIANTI

Si ricorda che per la realizzazione di impianti con materiali su richiesta è indispensabile PRENOTARE le combinazioni clone/portinnesto ORA, o comunque il prima possibile, per gli impianti 2021.

Su terreni non troppo compatti, si può **preparare il terreno in vista di impianti primaverili**: l'azione combinata del gelo/disgelo agevola la disgregazione delle zolle e la creazione di uno strato ben aerato ed esplorabile dalle radici. Di seguito di propone una tabella con le caratteristiche dei portinnesti più utilizzati dai vivaisti.

PORTINNESTO	GENITORI	CARATTERISTICHE
Kober 5BB	Berlandieri x Riparia	Buona resistenza alla siccità, elevata vigoria, molto adattabile
S.O.4		Discreta resistenza alla siccità, sensibile alla carenza di Magnesio, medio alta vigoria
420A		Molto equilibrato, di giusta vigoria, mal sopporta il ristoppio, discreta resistenza alla siccità
161-49		Mediamente vigoroso, si adatta ai terreni asciutti, compatti e mediamente clorosanti, resistente alla carenza di Potassio
157-11		Mediamente vigoroso, discretamente equilibrato, teme i terreni acidi
3309	Riparia x Rupestris	Ridotta vigoria, ottimi risultati qualitativi, non tollera terreni difficili
101-14		Ridotta vigoria, discreta resistenza alla siccità e ai terreni compatti, sensibile alla carenza di Potassio
140 Ruggeri	Berlandieri x Rupestris	Elevata vigoria, buona resistenza alla siccità, buona resistenza la calcare attivo, bene per terreni magri e compatti
110 Richter		Media vigoria, si adatta bene ai terreni asciutti, siccitosi e poveri
1103 Paulsen		Elevata vigoria, ottima resistenza alla siccità e alla compattezza del suolo, sensibile alla carenza di Potassio, medio-alta resistenza la calcare attivo (20%)
41B	Vinifera x Berlandieri	Ottima resistenza al calcare, buona resistenza alla siccità e alla compattezza, media vigoria
Fercal		Elevata resistenza al calcare attivo, vigoroso, sensibile alla carenza di Magnesio
Gravesac	161-49 x 3309	Portainnesto adatto ai terreni acidi, debole, ottima qualità, poco produttivo
M1	106/8 x Berlandieri	Ridotta vigoria, elevata resistenza alla clorosi ferrica; mediamente resistente alla salinità
M2	Teleki 8Bx333 E.M.	Vigora medio alta, buona resistenza alla clorosi ferrica, buona resistenza alla salinità e allo stress idrico
M3	R27xTeleki 5C	Vigore ridotto, elevato assorbimento del potassio, buona resistenza alla salinità, media resistenza alla siccità
M4	41BxBerlandieri	Vigore medio, ottima resistenza alla siccità, elevata resistenza alla salinità

MELO

DIVISIONE DELLE MACROZONE:

ZONA 1: Piancamuno –Artogne – Gianico – Darfo B.T. Angolo Terme – Piancogno;
ZONA 2: Esine –Berzo Inferiore – Bienno – Breno –Cividate Camuno – Malegno – Ossimo – Lozio –Losine – Niardo – Braone – Cerveno – Ono San Pietro - Ceto- Borno;
ZONA 3: Cimbergo – Paspardo – Cevo – Capo di Ponte – Sellero – Cedegolo- Paisco Loveno – Saviore dell'Adamello – Berzo Demo - Malonno – Corteno Golgi – Sonico – Edolo.

➔ MATURAZIONE

FUJI: la varietà è giunta alla maturazione nelle zone tardive sopra il Comune di Breno.

➔ SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA (IN VERDE PRINCIPI ATTIVI BIOLOGICI)

TICCHIOLATURA (si è concluso il periodo delle infezioni primarie)

A fine raccolta si consiglia di effettuare un trattamento con urea (5 kg/hl) miscelata a un prodotto contenente boro.
Nel biologico utilizzare un concime fogliare a base di azoto miscelato al boro (entrambi i prodotti devono riportare l'autorizzazione in agricoltura biologica).
Se possibile risulta molto utile, per la difesa, asportare o trinciare le foglie cadute a terra.

CANCRI RAMEALI

Fig. 1: Sintomi di cancri rameali

In caso si abbiano piante affette da queste patologie si consiglia, dove possibile, di asportare le parti infette. E' possibile nei casi più gravi effettuare dei trattamenti a base di **rame** a metà caduta foglie.

DIVISIONE DELLE MACROZONE:

ZONA 1: PIANCAMUNO –ARTOGNE – GIANICO – DARFO B.T. ANGOLO TERME – PIANCOGNO;
ZONA 2: BORNO - ESINE –BERZO INFERIORE – BIENNO – BRENO –CIVIDATE CAMUNO – MALEGNO – OSSIMO – LOZIO – LOSINE –NIARDO – BRAONE – CERVENO – ONO SAN PIETRO - CETO;
ZONA 3: CIMBERGO – PASPARDO – CEVO – CAPO DI PONTE – SELLERO – CEDEGOLO- PAISCO LOVENO – SAVIORE DELL'ADAMELLO – BERZO DEMO - MALONNO – CORTENO GOLGI – SONICO – EDOLO.
ZONA 4: MONNO – INCUDINE – VEZZA D'OGLIO – VIONE – TEMÙ –PONTE DI LEGNO.

➔ PRATICHE COLTURALI

POTATURA DEL LAMPONE UNIFERO

La potatura delle cultivar unifere si effettua alla fine dell'inverno, eliminando i tralci che hanno prodotto e diradando i polloni in modo da lasciarne 10/12 per metro lineare, scelti tra quelli di diametro non eccessivo (come una sigaretta) ben lignificati e vitali, cimandoli 10 cm sopra l'ultimo filo; sarebbe buona norma anticipare l'eliminazione dei tralci in estate/autunno alla fine della produzione, per consentire una maggiore illuminazione e aerazione dei polloni rimanenti.

POTATURA DEL LAMPONE RIFIORENTE

La potatura è molto semplice, e prevede il taglio a raso di tutta la vegetazione alla fine della stagione vegetativa, nel periodo autunnale. Se si vogliono effettuare 2 produzioni è possibile lasciare 5-8 polloni che l'anno seguente porteranno una produzione anticipata (la seconda produzione è di modeste dimensioni). I polloni che rimangono devono essere cimati avendo cura di asportare la zona che ha portato il frutto.

POTATURA DELLA MORA

Con la potatura invernale si procederà ad eliminare i tralci che hanno prodotto e a diradare i nuovi polloni, in modo da lasciarne 4-5 per pianta, scelti tra i mediamente vigorosi. Si cimeranno a 1,6-1,8 m di altezza ribattendo gli anticipati a 2-3 gemme.

➔ SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA (IN VERDE PRINCIPI ATTIVI BIOLOGICI)

CILIEGIO: si consiglia di effettuare 2 trattamenti con **rame** tra inizio caduta foglie e fine caduta foglie.

CECIDOMIA DEL POLLONE: Durante le operazioni di potatura del lampone prestare attenzione ai tralci che presentano rigonfiamenti simili a quello della foto a lato. In caso di ritrovamento, asportare il tralcio e allontanarlo dall'impianto per limitare possibili fonti di inoculo.

Fig. 2: Evidenti sintomi di Cecidomia del pollone

MIRTILLO: E' possibile effettuare prima della completa caduta delle foglie un trattamento con **Rame**.
E' possibile inoltre al fine di aumentare le riserve della pianta effettuare un trattamento con urea (3 kg/hl) miscelata a un prodotto contenente potassio in modo da favorire una ripresa vegetativa ottimale nella stagione successiva.

OLIVO

DIVISIONE DELLE MACROZONE:

ZONA 1: PIANCAMUNO – GIANICO – ARTOGNE – DARFO B.T.(DESTRA OROGRAFICA DEL FIUME OGLIO);
ZONA 2: DARFO B.T. (SINISTRA OROGRAFICA DEL FIUME OGLIO) – ANGOLO TERME – PIANCOGNO - BORNO;
ZONA 3: OSSIMO – MALEGNO – CIVIDATE CAMUNO – ESINE – BERZO INFERIORE - BIENNO;
ZONA 4: BRENO – NIARDO – BRAONE – LOSINE – LOZIO – BRAONE – CERVENO – ONO SAN PIETRO – CETO;
ZONA 5: CAPO DI PONTE – CIMBERGO – PASPARDO – SELLERO – CEVO – CEDEGOLO – BERZO DEMO

➔ FASE FENOLOGICA

In tutte le zone l'ulivo è nella fase di maturazione / raccolta.
Le rese attuali risultano inferiori alla media del periodo.

Fig. 3: Olive prossime alla maturazione

➔ SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA (IN VERDE PRINCIPI ATTIVI BIOLOGICI)

MOSCA DELL'ULIVO

In Valle Camonica la presenza di mosca delle olive è stabile e bassa, con la maggior parte degli individui osservati nelle zone precoci (zona 1 e 2). Sono state inoltre rinvenute punture sulle olive da olio più o meno diffuse a seconda della zona. MANTENERE ALTA L'ATTENZIONE, IN CASO SI RISCONTINO ATTACCHI PROSSIMI ALLLA SOGLIA DI DANNO ANTICIPARE LA RACCOLTA.

Alla fine della raccolta effettuare un trattamento con un prodotto **Rameico.**

➔ PRATICHE COLTURALI

RACCOLTA E CONSERVAZIONE

La raccolta rappresentano un momento fondamentale per la qualità dell'olio e per evitare possibili danni si consiglia di seguire le seguenti indicazioni base:

- Disporre di contenitori/cassette idonei (aperti, rigidi, che prevedano un'altezza dello strato di olive non superiore a 30 cm). Evitare i sacchi.
- Stoccare in ambienti idonei (coperti, arieggiati, puliti, inodori e con temperatura possibilmente inferiore a 15 °C)
- Limitare il tempo fra la raccolta e la frangitura (da poche ore fino ad un massimo di 48 ore in funzione dell'integrità delle olive e della temperatura).

Fig. 4: Esempio di Cassette idonee alla raccolta delle olive.

Una volta ottenuto l'olio si consiglia di conservarlo a una temperatura di circa 15-20°C, in assenza di luce e in stanze prive di odori.

LE INDICAZIONI NEL BOLLETTINO NON SONO VINCOLANTI. CIASCUNA AZIENDA È COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE PROPRIE STRATEGIE

COMUNITÀ MONTANA
DEL SEBINO BRESCIANO

zona 6 della Lombardia

SERVIZIO DI ANALISI DELL'OLIO

MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020

Gli olivicoltori e/o privati residenti che producono olio sul territorio della CM Sebino, potranno portare il proprio prodotto per **l'analisi di acidità e perossidi.** Prezzo convenzionato **€ 12.**

Il prezzo delle analisi **per i non residenti** e **per coloro che non hanno oliveti nei Comuni della Comunità Montana** è di **€ 15.**

IL PAGAMENTO SI EFFETTUA AL MOMENTO DELLA CONSEGNA DEL CAMPIONE

CONSEGNA CAMPIONI

I campioni di olio si consegnano in contenitori nuovi e puliti,
nei giorni Mercoledì e Giovedì tra le ore 9 e le ore 12
presso i nostri uffici: Sale Marasino, Via Roma 41.

>Non saranno accettate bottiglie di plastica, vasetti di marmellata o simili<

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Verrà richiesto un indirizzo di posta elettronica per l'invio dei risultati

•

In ottemperamento alle norme anti-Covid l'accesso agli uffici deve avvenire con le modalità prescritte: obbligo di mascherina, misurazione della temperatura corporea, mantenimento delle distanze interpersonali.

•

L'Ente si riserva di sospendere il servizio con l'evolversi della situazione epidemiologica e con le eventuali prescrizioni.

25057 – SALE MARASINO (BS)
Via Roma, 41
Telefono: 030-986314 r.a. – Fax 030-9867147
E-mail: info@cmsebino.brescia.it
Internet: www.cmsebino.brescia.it
Cod. Fisc. 80018850174